



संयुक्ती फूल बाली पात्रो



महिना	वैशाख	जेठ	असार	साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	मसिर	पुस	माघ	फागुन	चैत
हप्ता	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४
मौसम	 											
वर्षा	 											
हिँड	 											
गर्नी प्लाष्टिक टर्नेल भित्र	 											

कीराको व्यवस्थापन



१. पातमा सुरुङ्ग बनाउने कीरा (Leaf miner)

- कीरा नलागेको स्वरथ बेर्ना लगाउने
- कीरा लागेका पातहरू हटाउने
- नीमजन्य विषादीको प्रयोग गर्ने



२. रातो सुलसुले (Red spider mite)

- सिंचाइको रात्रो प्रबन्ध मिलाउने
- एबामेकिन्युक्त विषादीको प्रयोग गर्ने



३. थ्रिप्स (Thrips)

- वरिपरी सफा राख्ने
- भारपात नियन्त्रण गर्ने
- शिकारी कीराको संरक्षण गर्ने
- नीमजन्य विषादीको प्रयोग गर्ने
- ईमिडाक्लोरपेड १ मिलि प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने



४. लाही (Aphid)

- प्राकृतिक शत्रुहरू जस्तै: लेडि बर्ड बिटल किराको संरक्षण गर्ने
- पहेलो पासोको प्रयोग गर्ने
- दैहिक विषादी डाइमेथोएट, ईमिडाक्लोरपेड प्रयोग गर्ने



१. बेर्ना कुहिने रोग (Damping off)

- दुसीनाशक विषादी जस्तै बेर्ना लगाउने
- नर्सरी ब्याडमा बीउ बाकलो नार्चने
- पानी निकासको उचित व्यवस्था मिलाउने
- बीउ रोनुभन्दा ३-४ दिन अगाधे २% फर्मालिनले माटो निर्मलीकरण गर्ने
- ब्याडमा रोगको लक्षण देखिनासाथ मेन्कोजेव ७५% डब्लु पी २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर माटोमा छर्ने
- मुख्य जमिनमा रोग लाग्न नदिन बेर्ना सारेको १० दिनपछि मेन्कोजेव ७५% डब्लुपी २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर स्पे गर्ने
- कार्बन्डाजिम ७५% डब्लुपी २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर स्पे गर्ने



२. पातको थोप्ले र डदुगा रोग (Leaf spot and blight)

- सिफारिस मात्रामा मलखादको प्रयोग गर्ने
- सिंचाइको उचित व्यवस्था मिलाउने
- वरिपरी सफा राख्ने
- दुसीनाशक विषादी हेक्जाकोनाजोल प्रयोग गर्ने



३. सेतो दुसी (Powdery mildew)

- खेतवारी सफा राख्ने
- रोग लागेको पातहरू र भारहरू नष्ट गर्ने
- डिनोकाप (काराथेन) वा कार्बन्डाजिम (बेमिट्टन) २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई पातहरू राम्ररी भिजे गरी छर्ने
- द्राइडेमर्फ (क्यालिकिजन) प्रयोग गर्ने



४. फूल कुहिने/बोट्राइटिस रोट (Botrytis rot)

- खेतवारी सफा राख्ने
- मरेका र सुकेका हांगाविंगा हटाउने र पातहरू हटाउने
- प्रोपिनेव युक्त दुसीनाशक विषादी प्रयोग गर्ने

व्यावसायिक खेतीको लागि उपयुक्त हावापानी तथा माटो

- उचाई: १५०-२०० मिटर (सबैभन्दा उपयुक्त)
- वार्षिक औषत तापक्रम: १५-२०°C सेन्टिग्रेड
- प्रशस्त प्राकृतिक पदार्थ भएको पानी नजम्ने, पि.एच ७-७.५
- बजारको नजिक, सिंचाई र बाटोको सुविधा भएको

जातहरू

अफिकन सरापत्री: कलकत्तिया ओरेन्ज (Calcattia Orange), कलकत्तिया यल्लो (Calcattia Yellow)
अफिकन जायान्ट, अफिकन जायान्ट डब्ल ओरेन्ज, कर्मा - ५५५ ओरेन्ज (Karma-555-Orange)
फ्रेंच सरापत्री: पुसा अरपिता, भ्यालेन्सिया, रस्टि रेड

नर्सरी ब्याडको तयारी

- नर्सरी राख्ने समय बजारको मागले निर्धारण गर्दछ
- १ मिटर चौडाई र अवश